

Porodica	Kultura - Hrvatski	Podvrsta/ varijetet	Latinski	Domaće sorte	način razmnožavanja	trajnost	srodne vrste s kojima se križa	prostorna izolocija	minimalna veličina populacije	moгуći prinosi kg/ha (prema Lešić, 1993)	Probiranje i obilazak usjeva	Vrijeme žetve	metode čišćenja	veličina uzorka za analizu g	čistoća %	maksimalni sadržaj drugih vrsta %	klijavost %	biljna putovnica	trajanje klijavosti god.	Maksimalna veličina sitnog pakiranja g
Mahunarke (Fabaceae)	grah	niski/visoki zrnaš/mahunar	Phaseolus vulgaris	Slavonski zeleni' (č) 'Maksimirski' (NSL) 'Alida' (NSL) 'Kristina' (NSL) 'Marina' (NSL) Niski trešnjevac' (NSL)	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	jednogodišnja	ljepocvjetni grah	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od ljepocvjetnog - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	600-1200 kg	* tijekom vegetacije * prije žetve	kad je sjeme suho u suhim ljetima * ako je ljeto vlažno, onda kad je 70-80% mahuna zrelo i suho	kombajn, selektor, ručno	700	98	0,1	75	DA	4-5	5000
	Ljepocvjetni grah		Phaseolus coccineus	domaće lokalne populacije evidentirane u cpgrd bazi	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	jednogodišnja	obični grah	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od ljepocvjetnog graha - 300 m certificirano, 500 m	10-15 biljaka	600-3000	* tijekom vegetacije * prije žetve	kad je sjeme suho u suhim ljetima * ako je ljeto vlažno, onda kad je 70-80% mahuna zrelo i suho	kombajn, selektor, ručno	1000	98	0,1	80	DA	4-5	5000
	grašak	niski, visoki i srednje visoki, šećerac, ozimi stočni	Pisum sativum	Grašak šećerac' (NLS) domaće sorte upisane u cpgrd bazu	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	jednogodišnja	/	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od običnog graha - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	2000-3000	* u vrijeme cvatnje - izdvojiti biljke koje kasno cvatu * prije žetve	kad je sjeme suho u suhim ljetima * ako je ljeto vlažno, onda kad je 70-80% mahuna zrelo i suho	kombajn, selektor, ručno	500	98	0,1	80	DA	4-5	5000
	bob	bobica, konjski bob, krupnozrni bob	Vicia faba	domaće lokalne populacije evidentirane u cpgrd bazi	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	jednogodišnja	/	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od običnog graha - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	1500-2500	* prije cvatnje * u tehnološkoj zriobi * prije žetve	kad je sjeme suho u suhim ljetima * ako je ljeto vlažno, onda kad je 70-80% mahuna zrelo i suho	kombajn, selektor, ručno	1000	98	0,1	80	DA	4-5	5000
Glavočike (Asteraceae)	salata	lisnate, dugolisne, glavatice (puterice, kristalke, batavije)	Lactuca sativa	Zagrebačka kristal ljetna' (čs) 'Posavka' (NSL) 'Vegorka' (NSL) 'Hrastov list' (NSL) 'Crveni hrastov list' (NSL) 'Majska kraljica' 'Dalmatinska ledenka' 'Kristal ljetna žuta' 'Ljetna puterica' (cpgrd) 'Proljetna crvena' (cpgrd) 'Proljetna' (cpgrd) ostale domaće sorte u	samooplodna	jednogodišnja	divlja salata	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od divlje salate - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	400-800	* kod presađivanja/ prorjeđivanja * u tehnološkoj zrelosti - ukloniti biljke koje rano cvatu * prema potrebi kontrola bolesti * prije žetve	kad 50% biljaka ima bijeli papus	ručno: dosušivanje biljaka okrenutih naopako u vrećama, rešeto, sito, vjetrenje kombajnom: dvofazno (žetva u jutro)	10	95	0,5	75	NE	4-5	100
	endivija	lisnata, kudrava, eskarol	Cichorium endivia	Dalmatinska kopica'	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	jednogodišnji ili dvogodišnji uzgoj	ponekad divlja cikorija	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od divlje cikorije - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	400-700 kg (jedna biljka 4-7 g) kudrave sorte daju 30% manje sjemena	* kod presađivanja/ prorjeđivanja * u tehnološkoj zrelosti - ukloniti biljke koje rano cvatu * prema potrebi kontrola bolesti * prije žetve	kada stabljika potamni, donji listovi se osuše, 70% glavica je zrelo	ručno: dosušivanje biljaka okrenutih naopako u vrećama, rešeto, sito, vjetrenje kombajnom: dvofazno (žetva u jutro)	15	95	1	65	NE	4-6	100
	Radič	lisnati, glavati, Witlof	Cichorium intibus var. Foliosum	/	samooplodna s mogućnošću stranooplodnje	dvogodišnja	divlja cikorija, industrijska cikorija, endivija	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od divlje cikorije, industrijske cikorije i endivije - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15 biljaka	300-600	* kod presađivanja/ prorjeđivanja * u tehnološkoj zrelosti - kod glavatih sorti izbaciti one koje ne formiraju čvrstu glavicu * prema potrebi kontrola bolesti * prije žetve	kada stabljika potamni, donji listovi se osuše, 70% glavica je zrelo	ručno: dosušivanje biljaka okrenutih naopako u vrećama, rešeto, sito, vjetrenje kombajnom: dvofazno (žetva u jutro)	15	95	1,5	65	NE	3	100

Štitarke (Apiaceae)	Mrkva		Daucus carota	Domaća žuta'	stranooplodna - kukci	dvogodišnja	divlja mrkva	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od divlje mrkve - 300 m certificirano, 500 m osnovno	minimalno 30 ali i više 50-100	500-600kg rane sorte 600-1200 srednje kasne i kasne	* nakon vađenja korijena - izbacuju se sve koje su nepravilnog oblika, zelene baze, bolesne, oštećene, one koje pucaju u tlu, slabo razvijene i ne odgovaraju sorti *prije presađivanja - izbacuju se one koje nisu dobro prezimile * u vegetaciji - one koje rano tjeraju cvjetnu stabljiku i bolesne * u zrelosti za određivanje vremena berbe - ostala poželjna svojstva su otpornost ili tolerantnost na nametnike, količina šećera i suhe tvari u korjenu	kad su umbele drugog reda zrele, a one trećeg reda počele smediti	* manje količine kose se sa stabljikom i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetuu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima 5-6 dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti trifolin i pneumatski stol, specijalni strojevi za skidanje dlačica	10	95	1	65	NE	3-4	500
	Peršin	korjenaš, lišćar	Petroselinum crispum ssp. crispum, Petroselinum crispum ssp. tuberosum	Domaći lišćar' (č)	stranooplodna - kukci	dvogodišnja	rijetko s celerom	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od celera - 300 m certificirano, 500 m osnovno	20-30	600-1200	* nakon vađenja korijena - izbacuju se svi koji su nepravilnog oblika, bolesni, oštećeni, oni koji pucaju u tlu, slabo razvijeni i ne odgovaraju sorti *prije presađivanja - izbacuju se oni koje nisu dobro prezimili * u vegetaciji - oni koji rano tjeraju cvjetnu stabljiku i bolesni * u zrelosti za određivanje vremena berbe - ostala poželjna svojstva su otpornost ili tolerantnost na bolesti i nametnike	kad su umbele drugog reda zrele, a one trećeg reda počele smediti	* manje količine kose se sa stabljikom i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetuu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima 5-6 dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti trifolin i pneumatski stol	10	97	1	65	NE	2-3	100
	Celer	lišćar, rebraš, korjenaš	Apium graveolens var. secalinum, A.g. var. dulce, A.g. var. rapaceum	lokalne populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu i sortne liste	stranooplodna - kukci	dvogodišnja	rijetko s peršinom	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od peršina - 300 m certificirano, 500 m osnovno	15	500-1000	* kod korjenaša - nakon vađenja korijena - izbacuju se svi koji su nepravilnog oblika, prekrupni ili presitni i ne odgovaraju sorti, spužvasti u središtu, bolesni, oštećeni, *prije presađivanja - izbacuju se oni koje nisu dobro prezimili * kod rebraša, izbacuju se oni prekratkih, tvrdih stabljika, a kod lišćara oni kržljave rozete *u vegetaciji - oni koji rano tjeraju cvjetnu stabljiku i bolesni * u zrelosti za određivanje vremena berbe - ostala poželjna svojstva su otpornost ili tolerantnost na bolesti i nametnike	kad su umbele drugog reda zrele, a one trećeg reda počele smediti manje količine beru se postupno	* manje količine kose se sa stabljikom i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetuu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima 5-6 dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti trifolin i pneumatski stol	5	97	1	70	NE	3-4	100

Štitarke (Apiaceae)	Pasternjak		Pastinaca sativa	Dugi bijeli' 'Podravkin bijeli' (cpgrd)	stranooplodan - kukci	dvogodišnji	divlji pasternjak	* od drugih sorata 100m *od divljeg pasternjaka 300 m	15-20		* nakon vađenja korijena - izbacuju se svi koji su nepravilnog oblika, bolesni, oštećeni, oni koji pucaju u tlu, slabo razvijeni i ne odgovaraju sorti *prije presađivanja - izbacuju se oni koje nisu dobro prezimili * u vegetaciji - oni koji rano tjeraju cvjetnu stabljiku i bolesni * u zrelosti za određivanje vremena berbe - ostala poželjna svojstva su otpornost ili tolerantnost na bolesti i nametnike	sjeme je zrelo kad poprimi žuto smeđu boju za veće količine trenutak žetve je kad je sjeme zrelo na prva dva reda štitova jer je kod ostalih oplodnja manja	* manje količine beru se u više navrata kako pojedini štitoi dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima 5-6 dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti					NE	1-2	100
	Komorač	divlji, slatki, firentinski	Foeniculum vulgare	divlje populacije u cpgrd bazi	stranooplodna - kukci	dvogodišnji ili trajan (rjeđe jednogodišnji)	divlji komorač u primorskim krajevima gdje je dio samonikle flore	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od divljeg komorača - 300 m certificirano, 500 m osnovno	15-20		* firentinski: u tehnološkoj zrelosti odabiru se lukovice, nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje su loše prezimile, u vegetaciji one koje rano tjeraju cvjetnu stabljiku, u zrelosti za određivanje trenutka žetve * lisnate forme odabiru se u prvoj godini prema kvaliteti lista, u drugoj godini u vegetaciji se izbacuju bolesne *za sjeme, u prvoj godini pregled na bolesti i odabir onih koje rano cvatu, u drugoj godini, u zriobi, odabiru se one kvalitetog roda	kad su umbele drugog reda zrele, a one trećeg reda počele smediti manje količine beru se postupno	* manje količine beru se u više navrata kako pojedini štitoi dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima 5-6 dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti trifolin i pneumatski stol	25	96	1	70	NE	3-4	100
Lukovi (Amarillidaceae)	Luk		Allium cepa	Dubravski crveni" (č) 'Istarski ljubičasti' (č) 'Istarski žuti' (č) 'Slavonski ljubičasti' (č) 'Turopoljski' (č) 'Dolačka kapulica' (NSL) 'Rapski žuti pogačar' 'Golubički luk' 'Hercegovački luk' 'Konavljanski (Konavoski) luk' 'Močiljski luk' 'Sinjski luk'	stranooplodna - kukci	trogodišnja ili dvogodišja	križaju se različite sorte iste vrste ali treba obratiti pažnju na okolne usjeve luka za potrošnju jer ponekad i u proizvodnji može potjerati cvjetnu stabljiku i cvasti	* propisano: od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * u praksi 1500 m među sortama	15-20	500-1200 kg	* lučice i lukovice odabiru se prije i nakon skladištenja - zdrave, karakteristične za uzgajanu sortu, dovoljno velike. Poželjna svojstva su dobro skladištenje, otpornost na prorastanje u skladištu i rano tjeranje cvjetne stabljike, tolerantnost ili otpornost na bolesti i štetnike	Kad se 10 % tobolaca u cvatnoj glavi otvori i pokazuje crno sjeme	* naknadno dozrijevanje odvija se u tankom sloju na zasjenjenom, prozračnom mjestu. * sjeme se čisti sitima i vjetrenjem, a može se čistiti i potapanjem u vodu do 3 min pri čemu se loše sjeme i pljeva izdvaja na površini. Nakon toga se obavezno suši prije spremanja.	25	97	0,5	70	DA	2-3	500 sjeme, 1000 lučice
	Ljutika		Allium cepa var. aggregatum i Allium x cornutum	u cpgrd bazu je upisano 14 lokalnih popuacija	vegetativno	trajnica		* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno			* u vegetaciji pregled zdravstvenog stanja * prije i nakon skladištenja	Kada listovi požute i polegnu						DA		1000 lučice
	Stogodišnji luk		Allium cepa var. proliferum		vegetativno	trajnica												DA		500 sjeme, 1000 lučice
	Zimski luk		Allium fistulosum					* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno						15	97	0,5	65	NE		100 sjeme
	Vlasac		Allium schoenoprasum			trajnica		* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno	sjemenom 10, vegetativno 3-5					15	97	0,5	65	NE		100

Lukovi (Amarillidaceae)	Češnjak		Allium sativum	Brgudski ozimi' sinonim 'Benkovački' (č) 'Cerički ozimi' (č) 'Istarski crveni' (č) 'Podravski ozimi' (č) 'Slavonski ozimi' (č) 'Šokac' (č) 'Domaći jari' 'Domaći ozimi' 'Petrinjski ozimi' 'Polaćki ozimi' 'Ljubitovački' u cpgrd bazi upisano je ukupno 56 primki	vegetativno	trajnica					* u vegetaciji pregled zdravstvenog stanja * prije i nakon skladištenja	Kada listovi požute i polegnu		20	97	0,5	65	NE		1000 češnjevi
	Poriluk		Allium ampeloprasum ssp. porrum		stranooplodan - kukci	dvogodišnji	divlji poriluk	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od običnog graha - 300 m certificirano, 500 m osnovno	10-15	800	* u vegetaciji pregled zdravstvenog stanja * u tehnološkoj zrelosti - karakteristike sorte i poželjna svostva * nakon zime - biljke koje nisu dobro prezimile i one koje prerano tjeraju cvjetnu stabljiku	Kad se 10 % tobolaca u cvatnoj glavi otvori i pokazuje crno sjeme		20	97	0,5	65	DA	2-3	100
	Biser luk		Allium ampeloprasum					* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno * od običnog graha - 300 m certificirano, 500 m osnovno						20	97	0,5	65	NE		100
Krašnice (Brassicaceae)	Kupus	bijeli i crveni	Brassica oleracea var. capitata	Brgujski' (č) 'Ogulinski' (č) 'Ogulinski kupus' (č) 'Varaždinski' (č) 'Čepinski' (č) 'Vranski' (NSL) 'Vranski 34' (NSL) 'Cerski' (NSL)	stranooplodan - kukci: pčele, muhe cvjetare i obične muhe	dvogodišnji	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	600-1200	* u tehnološkoj zriobi - izbacuju se biljke koje nisu savile glavicu, različite od karakteristika sorte, bolesne, rahlih glavica. Poželjna svojstva su otpornost, dobar okus, rano dozrijevanje * nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje nisu dobro prezimile.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojedinim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešet i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	4-5	100
	Kelj		Brassica oleracea var. sabauda	domaće sorte i populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu	stranooplodan - kukci: pčele, muhe cvjetare i obične muhe	dvogodišnji	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	600-1200	* u tehnološkoj zriobi - izbacuju se biljke koje nisu savile glavicu, različite od karakteristika sorte, bolesne, rahlih glavica. Poželjna svojstva su otpornost, dobar okus, rano dozrijevanje * nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje nisu dobro prezimile.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojedinim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	4-5	100

Kistašice (Brassicaceae)	Kelj pupčar		Brassica oleracea var.gemmiferae	domaće sorte i populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu	stranooplodan - kukci	dvogodišnji	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	600-1200	* u tehnološkoj zriobi - izbacuju se biljke koje nejednoliko razvijaju glavice i čije su glavice rahle, različite od karakteristika sorte, bolesne. Poželjna svojstva su otpornost, dobar okus, rano dozrijevanje * nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje nisu dobro prezimile.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se ručno pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	4-5	100
	Raštika	lisnati kelj i raštika	Brassica oleracea var. acephala forme sabelica i viridis	domaće populacije raštike u cpgrd bazi (8 primki)	stranooplodan - kukci	dvogodišnja	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	600-1200	* u tehnološkoj zriobi - odabiru se otporne biljke bogatog i ukusnog lišća, a odbacuju bolesne. * nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje nisu dobro prezimile.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine se kod nas nisu proizvodile, a mogle bi se brati kao i druge kupusnjače da se najprije ručno pokose, ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	6 i više	100
	Korabica		Brassica oleracea var. gongylodes	domaće sorte i populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu	stranooplodan - kukci	dvogodišnja	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	400-600	* u tehnološkoj zriobi - odbacuju se bolesne, raspucale i oštećene, različite od sotre. Poželjna svojstva su dugo zadržavanje sočne zadebljale stabljike prije nego odrvni i otpornost * nakon prezimljavanja izbacuju se biljke koje nisu dobro prezimile.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	6 i više	100

Kistašice (Brassicaceae)	Cvjetača		Brassica oleracea var. botrytis	Trogirska rana' 'Trogirska srednje rana'	stranooplodan - kukci	dvogodišnja	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15 zdravih biljaka odabranih među najmanje 60	100-400	* u tehnološkoj zriobi odabiru se samo one bogate rozete lišća koje dobro štiti glavicu i lijepih pravilnih glavica u skladu s karakteristikama sorte, one koje duže ostaju u fazi glavica. Miču se one rastresitih glavica, one koje prerano tjeraju, bolesne i oštećene.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	70	NE	6 i više	100
	Brokula		Brassica oleracea var.italica	domaće sorte i populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu	stranooplodan - kukci	dvogodišnja	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	100-400	* u tehnološkoj zriobi odabiru se samo one bogate rozete lišća koje dobro štiti glavicu i lijepih pravilnih glavica u skladu s karakteristikama sorte, one koje duže ostaju u fazi glavica. Miču se one rastresitih glavica, one koje prerano tjeraju, bolesne i oštećene.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	25	97	1	75	NE	6 i više	100
	Kineski kupas		Brassica rapa ssp. chinensis	domaće sorte i populacije nisu opisane niti upisane u cpgrd bazu	stranooplodan - kukci	dvogodišnja	sve kupusnjače	* od drugih kupusnjača - osnovno 1000 m, certificirano 600 m * odr drugih sorti kupusa - osnovno 500 m, certificirano 300 m	10-15	400-600	* u tehnološkoj zriobi odabiru se samo one bogate rozete lišća u skladu s karakteristikama sorte. Miču se one koje prerano tjeraju cvjetnu stabljiku, bolesne i oštećene.	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojednim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja *veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti strojevi na bazi kombiniranih rešeta i vjetra i spiralni tijer	20	97	1	75	DA	6 i više	100

[illegible]

Krstaiće (Brassicaceae)	Rikola		Eruca sativa		stranooplodna - kukci	jednogodišnja	divlja rikola u primorskim krajevima	150 m	1m ²		* u tehnološkoj zrelosti * prije početka cvatnje - ukloniti biljke koje prerano tjeraju cvjetnu stabljiku	kada je oko 2/3 komuški zrelo	* manje količine beru se u više navrata kako komuške na pojedinim granama dozrijevaju i ostavljaju u vrećama ili ceradama na natkrivenom prozračnom mjestu da do kraja dozore i osuše se, a čiste se na rešetu, situ i strojevima na bazi vjetrenja * veće količine žanju se dvofazno, najprije se pokose rano u jutro i ostave u zbojevima nekoliko dana da se dosuše, a zatim se vrše kombajnom ili stacionarnom vršilicom * u doradi se mogu koristiti					NE	6 i više	
Pomoćnice (Solanaceae)	Rajčica		Lycopersicon esculentum	Brački jabučar' (č) Šibenski šljivar' (č) 'Volovsko srce' (NSL) 'Zagrebačka rana' (NSL)	samooplodna	jednogodišnja	/	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno	6-12	150–200	* u fazi presadnica - ukloniti one koje po tipu lista i rasta ne odgovaraju sorti * više puta u sezoni radi kontrole bolesti * u tehnološkoj zriobi - ukloniti one koji pokazuju znakove bolesti ili fizioloških poremećaja (zeleni prsten, vršna trulež, nejednoloko dozrijevanje...)	* kada su plodovi potpuno zreli	* fermentacija, ispiranje vodom na istu, sušenje	20	97	0,5	75	DA	6 i više	100
	Paprika		Capsicum annum	Feferoni crveni ljuti' (č) 'Feferoni zeleni blagi' (č) Feferoni žuti ljuti' (č) 'Virovitičanka' (č) 'Rotund žuti' (NSL) 'Rog' (NSL) 'Majkovačka žuta' (NSL) 'Babura žuta' (NSL) 'Babura zelena' (NSL) 'Botinečka žuta' (NSL) 'Viza' (NSL)	stranooplodna - kukci	jednogodišnja	feferoni i čili papričice (Capsicum frutescens) - ljutina je dominantno svojstvo!	* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno	6-12	100-400	* više puta u sezoni radi kontrole bolesti * u tehnološkoj zriobi	* u vrijeme potpune fiziološke zrelosti	* ručno čišćenje svježih plodova, ispiranje vodom radi uklanjanja nedozrelih sjemenki, sušenje	40	97	0,5	65	DA	4	100
	Patlidan		Solanum melongena	Domaći plavi'		jednogodišnja		* od drugih sorata - 100 m certificirano, 300 m osnovno	6-12	100-150	* više puta u sezoni radi kontrole bolesti * u tehnološkoj zriobi	* u vrijeme potpune fiziološke zrelosti, kada postaju smeđi i omekšaju	* ručno čišćenje svježih plodova ili fermentacija, ispiranje vodom radi uklanjanja nedozrelih sjemenki, sušenje	20	96	0,5	65	NE	do 6	100
	Krumpir		Solanum tuberosum	Brinjak' 'Poli'	vegetativno, samooplodan ako se uzgaja sjeme	jednogodišnja	/	/	25-30									DA		
Tikvenjače (Cucurbitaceae)	Krastavac		Cucumis sativus	krastavac salatar (CPGRD)	stranooplodan - kukci	jednogodišnja	/	100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12	300-800	u vegetaciji (bolesti), cvatnji (izdvajanje biljaka koje odstupaju od karakteristika), tehnološkoj i fiziološkoj zriobi	plodove je poželjno što duže ostaviti na vriježama, zreli plodovi promijene boju u žutu ili smeđu, a nakon berbe još 6-10 dana stoje na hrpama da dozore do kraja	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama	25	98	0,1	80	NE	6-7	100
	Lubenica		Citrus lanatus	Vukovarska' (č)	stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12	200-300	* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama	250	98	0,1	75	NE	5	500
	Dinja		Cucumis melo	Paška dinja'	stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12	250-350	* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama	100	98	0,1	75	NE	8	100
	Tikve		Cucurbita maxima		stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12	300-500	* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama	250	98	0,1	80	NE	8	500

Tikvenjače (Cucurbitaceae)	Tikvice		Cucurbita pepo		stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12	300-500	* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama	150	95	0,1	75	NE	8	500
	Lufa		Luffa cylindrica		stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12		* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* ručno čišćenje uz ispiranje vodom * veće količine mogu se čistiti fermentacijom ili kiselinama					NE	8	
	Šef tikva		Lagenaria siceraria		stranooplodna - kukci	jednogodišnja		100 m za certificirano i 300 m za osnovno sjeme	6-12		* 2-3 puta tijekom vegetacije * u fiziološkoj zrelosti	* u punoj fiziološkoj zrelosti	* sjeme se suši zajedno s plodom, suhi plodovi se buše i sjeme ispada					NE	8	
Lobodnjače (Chenopodiaceae)	Špinat		Spinacia oleracea		stranooplodan - vjetar	jednogodišnja		300 m certificirano, 600 m osnovno	25-30	600-2000	* 2-3 puta tijekom vegetacije - ukloniti biljke koje prerano tjeraju, bolesne, različite od sorte	srpanj/kolovoz kada je sjeme na donjim granama zrelo uz naknadno dozrijevanje	* ručno na sitima, rešetima i vjetrenjem *veće količine kombajnom	75	97	1	75	NE	4-5	500
	Blitva	lisnata, rebrašica	Beta vulgaris ssp.vulgaris var.cicla Beta vulgaris ssp.vulgaris var.flavescens	domaća blitva	stranooplodna - vjetar	dvogodišnja	cikla, stočna i šećerna repa	* od cikle 1000 m * od blitve različitih skupina sorata - osnovno 1000 m, certificirano 600 m *od blitve unutar iste skupine sorti - osnovno 600 m, certificirano 300 m	10	500-1500	* 2-3 puta tijekom vegetacije *nakon prezimljavanja	* kad je sjeme na osnovi grana smeđe i zerlo * manje količine žanju se ručno i ostavljaju u sjeni da naknadno dozriju, veće se žanju, ostavljaju u zbojevima i vrše kombajnom	* manje količine sitom i rešetom * veće količine vrše se kombajnom i dorađuju vjetrenjem i segmentiranjem	100	97	0,5	70 klupka	NE		500
	Cikla		Beta vulgaris var.conditiva		stranooplodna - vjetar	dvogodišnja	blitva, stočna i šećerna repa	* od blitve 1000 m *od drugih sorti cikle - osnovno 600 m, certificirano 300 m	10	500-1500	* 2-3 puta tijekom vegetacije * nakon vađenja i prije prezimljavanja *nakon prezimljavanja	* kad je sjeme na osnovi grana smeđe i zerlo * manje količine žanju se ručno i ostavljaju u sjeni da naknadno dozriju, veće se žanju, ostavljaju u zbojevima i vrše kombajnom	* manje količine sitom i rešetom * veće količine vrše se kombajnom i dorađuju vjetrenjem i segmentiranjem	100	97	0,5	50 klupka	NE		500
Dvornici (Polygonaceae)	Rabarbara		Rheum undulatum	Zagrebačka rabarbara' (NSL)	vegetativno - reznice podanka, rijetko sjemenom stranooplodna - kukci	trajnica		150 m	3-4			sjeme dozrijeva na biljci i skuplja se ručno	ručno, sitima	135	97	0,5	70	NE		100
	Heljda		Fagopyrum esculentum	Varaždinska heljda'	stranooplodna-kukci	jednogodišnja		250 m - certificirano 300 m - osnovno	1m ²	1500-2000			kombajnom	600	97	15	80	NE		